雜 錄 Miscellaneous

O仙水峠探藥記

昨夏朝比奈蕾軒先生ニ扈シテ信州伊那經由デ北澤峠ニ笈ヲ下シ、更ニ仙水峠ニ進ミ沿道各 地ノ草木ニ接シタ。其紀行文ハ既ニ朝比奈先生ニ先手ヲ打タレテ恐縮シテ居ルガ、シカシ先 生ノ紀行文ハ專ラ地衣ニ限定サレテ居ルノデ、余ハ其他ノ主ナルモノニツキ記述シテ此方面 ノ片鱗ヲ示スコトニスル。尚此行仙水峠デ、松江高等學校教授田邊和雄學士ト久方振リデ、 感激ノ對面ヲナシ、且ツ戸臺ノ河原デ東北帝大學生菅谷氏ニ綱逅シタノデ、人ハ類ヲ以テ集 リ同ジ様ナ舞臺ニ出演スルモノダト云フ感ヲ今更ナガラ 感ジサセラレタ。コンナ 事ガコ、 迄來テ始メテ判ツタノダカラ、僕ノ頭モ相當ナモノデアル。 サテ我等ノ部隊ハ、勇マシクモ、 黑河内カラ行動ヲ起シタノデアルガ、此邊ノ路傍ニハ、隨所ニみやまなでしこ (Dianthus shinanensis Mak.) が見ラレタガ、蛇紋岩片ノ散在セル路傍デ異彩ヲ放ツテ居タ。マタすぐ り (Ribes grossularioides Maxim.) ヲ認メタ。之ハ此ノ方面デナケレバ見ラレナイモノデ アル。東大腊葉庫ニハ、鳥居峠ト松原湖畔ノ標本ガアルガ、多クノ採集家カラ看渦サレテ居 ル仕合セモノラシイ。歸京後知人ニ此ノコトヲ話シタラ、何レモ冷笑的態度ヲ示サレタガ、 既ニ牧野先生ガ本誌第 VII 卷 p. 32 デ指摘サレタ通り、 外來品即チ Ribes Grossularia LINN. ト混同サレテノコトデアラウ。マタえぞえのき (Celtis Bungeana Blum. var. jesoensis Kudo) モアツタ。マタつるたで (Bilderdykia dumetra Dum.) が路傍ニアルノデ 勿體ナク思ツタノデアツタガ、之ナドハ少クトモ關東平野ヤ、丘陵地デ見ルコト不可能デア ル。マタしなのがき (Diospyros Lotus L.) ガ所々= 見ラレタガ、自生カ、澁ノ材料トシ テノ栽培カハ判然シナカツタ。戸臺川ト小黑川トノ合流點即チ戸臺部落ノ突端ガ、半島ノ様 =突出スル 地點ノ 南側ノ 河原=ハ、意外=モ むらさきぼたんづる (Clematis Takedana Mak.) ガ一株河原ニ匐ツテ居タノヲ發見シタ。ぼたんづるトくさぼたんトノ間種ト承ツテ 居ルガ、之ニハ無條件デ首肯スル以外賛成ノ形式ガ無イ事程左樣=其通リデアル。卽チ花色 へくさぼたんニ、マタ蕚が直立平開デアル點ハ兩者ノ性質ヲ共有シ、 莖ノ蔓性ナ點ハぼたん づる=似テ居ル。花色ハ植物總覽=ハ「暗菫色」トアルガ、原記相文[植物學雑誌 Vol. XXI (1907) p. 87] = ハ "dull violet" トアリ生本デハ原記相文ガ正シイ様=思ハレタ。本品 ハ信州白馬山下二股ガ原産地ノ由デ、東北地方ニモ産スル様ダガ此處ハ又別ノ産地トア解ス ルコトガ出來ルo然シ此處ハ餘リ日當リノヨイ河原ノ乾地ノ爲カ、葉ガイサ、カ短縮シテ居 タ。戶臺川ノ岩壁=ハまんしらうさきしだ (Gymnopteris Robertianum NEWMAN) ガ相當 = 生工、其レ=混ツテくものすしだ (Camptosorus sibiricus Ruprecht) ヤとがくしでんだ (Woodsia glabella. R. Br.) ガ景品ノ様=混生シテ居タ。マコトニ結構ナ景品デアツタ。 東大ニハ小泉博士ガ曾テ仙丈岳デ採ラレ"Woodsia glabella?"ト手記サレタ標本ガ藏サレ テ居ルガ、コンナ下ノ方ニモ有ルノハ面白イ。元來コノ小羊齒ハ、始メ戶隱ノ奥ノ院高妻山 ノ頂上デ發見サレとがくしでんだノ名ヲ得タト云フシ、朝比奈先生ハ白骨デ採ラレタト云フ

八丁坂デ相當汗ヲ 絞ッタ頃、一息ックト 蘚類 中ニへらたけ [Sathularia clavata (Schaeff) Saff.] が澤山アツタ。後デ小林義雄氏カラ諏訪デハ之ヲ罐詰ニシテ居ルト聞イ




テ、全ク喰フ事ニハ抜ケ目がナイノニ恐レ入ツタ。へらたけノ罐詰ト、蜂ノ子ノ罐詰、更ニ伊那名産河蟲ノ佃煮ナド取揃へタラ食膳ハ相當ナモノニナルデアラウ。ソレハソレトシテ、マタ小林氏ヲ煩ハシテ判ツタノデアルガ、地上ニ萬年たけノ様ナ色澤ヲ有シ、殆ンド無柄デ、不定形ナつちくらげ [Rhizia inflata (Schoff) Sacc.] ト云フモノニ出會ツタ。ナンデモ、明治44年8月5日ニ日光デ 故安田 篤氏が採集サレ、植物學雑誌 vol. XXVII

(1913) p. 503 デつちくらげト新稱サレ以後餘り採集サレタコトノ無イモノ、由デアル。ソレカラ八丁坂ニハ前川文夫氏が東亞植物圖託第一卷第一輯=圖託サレタおくやまからもり(Cacalia Maximowicziana Nakai & F. Maekawa var. alata F. Maekawa) がアリ、マタ登り詰メタ平坦ナ地點ニハおにしもつけノ群落ヤひかげしらすげ(Carex planiculmis Komarov), Helacleum dulce Fisher (はなうどノ一種), しうりざくら (Prunus Ssiori Fr. Schm.), しなのとりかぶと(Aconitum senanense Nakai), ひめしゃじん(Adenophora nikoensis Fr. & Sav.) ナドガアツタ。北澤小屋ノ附近ノ 清流沿ヒニハきそあざみ (Cirsium Fauriei Nakai), いはおとぎり(Hypericum Kamtschaticum Ledeb.) ノー型ナドガ重ナモノデ、殊二後者ハマコトニ見事デアツタ。序ナガラ、北澤小屋ハ靜寂ナ結構小屋デアツタ。北澤ト側水峠トノ間ニハせりばしほがま (Pedicularis Keiskei Fr. & Sav.), たかねひごたひ Saussrea Kai-montana Nakai), たかねからぼら (Anthoxanthum japonicum Hack) ナ

ドガ目ニツイタ。就中せりば しほがまハ余トシテハ木曾駒 以來暫ク振リデノ對面デアツ タ。

個水峠ハちづどけ=蔽ハレ タ岩塊ノ堆積デ、餘リ目立ツ タモノモナク、岩石ノ間=ち やらじこめつムじ(杉本順 一氏所名)(Rhododendron Tschonoskii MAXIM. f. tetramerum MAK.) が點在シ、其 中=白花石楠ガー本淋シク立 ツテ居タ、ソレヲ同行ノ額田



第2 圖 しろばなしやくなげ (Rhododendron ツテ居タ、ソレヲ同行ノ額田 Fauriae Franchet var. rufescens Nakai)

敏氏ガカメラニ納メタノガコ、ニ掲ゲタ寫眞デアルo

ソレカラ歸途戶臺川ノ河原デ、一種叢生シテ、高サ 25 cm 位、細葉デ殆ンド無毛、葉裏紫色、花柱が球形ノあかばなヲ得タ。 莖ノ折レ易イ事、毛ノ性質ナドカラいはあかばなニ因緣ヲツケ、其變種トシ、**戸台あかばな**ト新稱スルコトニシテ叱正ヲ仰グコトニシテ見タ。

Epilobium cephalostigma Hausskn.

var. linearifolium Hisauti, nov. var.

Planta perennis cæspitosa sabulosa. Caulis annuus erectus ca 25 cm altus fistulosus albo-papillosus ramifer, inferiore sublignosus fragilis. Folia brevipetiolata, petiolo papilloso, utvinque glabra sed juventute subtus purpurea basi et ad costam papillosa, margine remote mucronato dentata leviter papillosa recurvata 2-3 mm lata 1-2.5 cm longa. Petala roseola. Ovarium dense albo-papillosum. Capusula papillosa ca 1.5 cm longa. Coma alba.

Nom. Jap. Todai-Akabana (nov. nom.)

Hab. Nippon Hondô; Flumen Todai, Kami-Inagun, Todaigawa, Prov. Sinano. (Leg. K. Hisauti, 13 VIII 1937-Typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo.) Planta endemica.

(久內清孝 K. HISAUTI)



第 3 圖 戶臺あかばな (Epilobium cephalostigma var. linearifolium Hisauti) 1/4

〇みぢんこうきくさノ新分布地

みぢんこうきくさ (Wolffia microscopica Kurz.) 本種ハうきくさ科中デ根ヲ缺除スルモ